


平成28年度からの

子どもの予防接種スケジュール

この予防接種スケジュールは、標準的なスケジュールの例として作成しています。予防接種スケジュールについては「予防接種と子どもの健康」の冊子を参考にしながら立ててください。また、接種についてはお子さんの体調、病気の流行状況をみて接種医と相談して決めてください。予防接種を受ける前には、「予防接種と子どもの健康」の冊子を必ずお読みください。

| 予防接種の種類 | ワクチンの種類 | 0歳 | | | | | | | | | | | | 1歳 | | | | | | | | | | | | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 7歳6か月 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|--|----|----|----|----|----|-------|----|----|-----|-----|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 0か | 1か | 2か | 3か | 4か | 5か | 6か | 7か | 8か | 9か | 10か | 11か | 0か | 1か | 2か | 3か | 4か | 5か | 6か | 7か | 8か | 9か | 10か | 11か | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定期予防接種 | Hib感染症 | ① → ② → ③ | | | | | | | | | | | | ← ④ → | | | | | | | | | | | | 【Hib 初回】1回目と2回目及び、2回目と3回目は4~8週間の間隔で接種(3回目までの接種は12か月までに進行) | | | | | | | | | | | | 【Hib 追加】3回目接種から7~13か月の間隔をあけて接種 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小児の肺炎球菌感染症 | ① → ② → ③ | | | | | | | | | | | | ← ④ → | | | | | | | | | | | | 【小児の肺炎球菌 初回】1回目と2回目及び、2回目と3回目は27日以上の間隔をあけて接種(2回目までの接種は12か月までに進行) | | | | | | | | | | | | 【小児の肺炎球菌 追加】3回目接種から60日以上の間隔をあけて12~15か月齢に接種 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B型肝炎 | ① → ② → ③ | | | | | | | | | | | | ← ④ → | | | | | | | | | | | | 【B型肝炎】1回目と2回目は27日以上の間隔をあけて接種 | | | | | | | | | | | | 【B型肝炎3回目】1回目接種から139日以上の間隔をあけて接種 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ) | ① → ② → ③ | | | | | | | | | | | | ← ④ → | | | | | | | | | | | | 【四種混合 初回】1回目と2回目及び、2回目と3回目は3~8週間の間隔で接種 | | | | | | | | | | | | 【四種混合 追加】3回目接種から1年後に接種(最低6か月以上の間隔をあける) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 二種混合(ジフテリア・破傷風) | ① → ② → ③ | | | | | | | | | | | | ← ④ → | | | | | | | | | | | | 【二種混合】11~13歳未満(13歳になる日の前日まで) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BCG | ① → | | | | | | | | | | | | ← ④ → | | | | | | | | | | | | 【BCG】生後5か月~7か月の間に接種 | | | | | | | | | | | | 【MR2期】小学校入学の前年度(4月1日から翌年3月31日までの幼稚園年長相当)に接種 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 麻疹風疹混合(MR) | ① → | | | | | | | | | | | | ← ④ → | | | | | | | | | | | | 【MR1期】1歳になったらできるだけ早く!! | | | | | | | | | | | | ② → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水痘 | ① → | | | | | | | | | | | | ← ④ → | | | | | | | | | | | | 【水痘1回目】MR1期接種後、4週間過ぎたら、できるだけ早く接種を。 | | | | | | | | | | | | ② → | | | | | | | | | | | | 【水痘2回目】1回目接種から6~12か月の間隔をあけて接種(最低3か月以上の間隔をあける) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 日本脳炎 | ① → | | | | | | | | | | | | ← ④ → | | | | | | | | | | | | 【日本脳炎1期初回】1回目と2回目は6日以上の間隔で接種 | | | | | | | | | | | | ① → ② → ③ | | | | | | | | | | | | 【日本脳炎1期追加】2回目接種から1年後に接種(最低6か月以上の間隔をあける) | | | | | | | | | | | | ④ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

【ワクチンの種類が違う場合の接種間隔】



※ただし、医師が必要と認めた場合には同時接種が可能。

※同じ種類のワクチンを複数回接種する場合は、それぞれに定められた間隔があります。

定期予防接種の対象年齢

標準的な接種期間
(○の中の数字は何回目の接種かを表す)

●定期予防接種とは：予防接種法に基づく予防接種で、市が助成しますので原則費用は無料です。ただし、接種間隔・対象年齢等が守られない場合は、自己負担が生じる場合があります。

※接種にあたっては、必ず母子健康手帳を確認し接種回数及び接種間隔等を守って受けましょう!!

【問い合わせ先】吉野川市 健康推進課 TEL 0883-22-2268 FAX 0883-22-2245